

# 毒蛇咬傷之處治

## 辨別毒蛇咬傷毒性

出血性：毒牙痕在小牙痕之前端，且較大較深。

症狀：傷口局部疼痛，腫脹蔓延，紫斑、淤斑、起水泡、漿液血由傷口滲出、皮膚或皮下組織壞死、澄清褐色或黑褐色傷口流血。

蛇類：百步蛇，龜殼花，赤尾青竹絲。

---

神經毒：毒牙痕在小牙痕之兩側，且較小較淺

症狀：頭痛，頭暈，視力減退，口流唾液，肌肉痙攣，呼吸困難。

蛇類：兩傘節，眼鏡蛇。

## 被毒蛇咬傷時處治方式

1. 認清蛇的形狀、顏色及其他可能的特徵。
2. 將戒指、手環、手錶等束縛物拔除。
3. 真空抽吸器的使用可以用來吸出傷口的污血，特別是神經性毒蛇毒牙較短，較少腫脹，使用後的效果可能較好。使用三十分鐘約以吸出三十%左右的毒液。
4. 將患肢儘可能保持低於心臟的位置。
5. 儘速以彈性繃帶包紮患肢，包紮範圍自患部周圍往上包紮至高過二個關節。
6. 儘速送醫接受診治或抗蛇毒血清治療。

## 抗蛇毒血清

由蛇毒免疫馬匹所得到的高力價血清，含免疫球蛋白，用來治療毒蛇咬傷。

台灣的抗蛇毒血清可分為：

- 單價的抗百步蛇蛇毒血清。
- 多價的抗出血性。
- 抗神經性。

- 另有一種六價血清未上市，內含抗鎖蛇及其他五種常見毒蛇的抗蛇毒血清。

#### 血清選擇用法與劑量：

- 如能確定毒蛇種類，應注射單價血清。
- 如不能確定，則密切觀察症狀。
- 4小時內注射最有效，超過8小時者效果較差。
- 大量注射時應特別留意血清病之發生。

#### 注意事項

- 過敏反應：注射任何生物製劑均要注意觀察過敏反應的發生，嚴重時可能引起致死性休克。有痙攣及其他過敏等特異體質與曾接受血清療法或血清過敏性檢查陽性者，須小心。

## 毒蛇咬傷常犯之錯誤觀念

- 將傷肢抬高。
- 切開局部傷口，因為在緊急狀況下常消毒不完全或沒消毒，反而容易造成感染且毒液常注入較深部的組織切開傷口並無法將毒液清出。
- 用口吸出毒液，口腔內有很多的細菌，以口吸毒液，反倒可能造成傷口感染。萬一吸毒的人口內或胃內有傷口，則也可能成為第二位的受害者。
- 用止血帶在咬傷上側結紮，因為這種做法易使肢體腫脹更厲害，使局部循環變差，造成大量組織的壞死、潰爛，而可能走上截肢之途。
- 使用冰敷或冷敷，使用冰敷或冷敷，肢體腫脹局部血液循環變差，冷敷易造成組織的大量壞死，甚至需要截肢。
- 喝酒或食用刺激物，因喝酒可促進血液循環，反而可能使毒液吸收更快速。