

梅毒

梅毒是由梅毒螺旋體所引起的性傳染疾病。

梅毒是全球普遍存在的性傳染疾病，病患多半是15~59歲性活躍期的男性與女性。

傳播方式：

梅毒的主要傳染途徑是性行為傳染，也會透過輸血傳染。

如果傷口直接接觸到感染病患的精液、血液、陰道分泌物或其他黏膜分泌物、體液及其他分泌物，也可能被傳染。

潛伏期：

典型梅毒的潛伏期約10~90天，一般為3週，但也可能更久。

發病症狀：

梅毒是全身性慢性傳染病，症狀很複雜，而且變異性也大，梅毒通常會在皮膚或黏膜破損處形成病灶，而且很快散播到全身，侵犯全身的器官及組織，但病患也可能完全沒有臨床症狀。根據傳染期程及臨床表現，梅毒分為早期梅毒和晚期梅毒，界線以一年為區分，而早期梅毒通常包括一期梅毒與二期梅毒和早期潛伏性梅毒，晚期梅毒通常包括三期梅毒及晚期潛伏性梅毒，通常早期梅毒的傳染性較強。

1、一期梅毒

感染後2~4週或更久，在接觸處出現無痛性潰瘍及硬性下疳，無壓痛感，但按壓有清澈之滲出液溢出，內含大量梅毒螺旋菌，傳染性極高。容易發生在男性陰莖任何部位，女性則是在陰道。如果沒有接受治療，經過數週後，硬性下疳也會自動癒合消失，但病情會越來越嚴重。

2、二期梅毒

硬性下疳出現後4~6週會逐漸消失，而梅毒螺旋菌已從淋巴結進入血液並散播全身，以致全身組織器官全受影響，並能出現全身性症狀，包括扁平濕疣、皮疹、頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，肌肉、骨骼及關節疼痛等。皮疹是二期梅毒最常見之症狀，常是全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子，在身體皺褶處（如肛門）之皮疹，由於濕熱及磨擦產生表淺性潰瘍，稱「扁平濕疣」，內含大量梅毒螺旋菌，故具高傳染性。全身性淋巴腺腫也是常見症狀之一，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髁部之淋巴腫。

3、三期梅毒

通常發生於感染後 3~7 年，不少病患未經過一期或二期梅毒即進入三期梅毒。主要病變為「梅毒腫」，好犯皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織。

4、潛伏性梅毒

指梅毒進入完全無臨床症狀的時期，但體內仍有梅毒螺旋菌存在，對身體組織器官仍有破壞性，可分為早期潛伏性梅毒及晚期潛伏性梅毒。早期潛伏性梅毒為感染後未超過 1 年之無症狀期，病患仍具傳染性；晚期潛伏性梅毒則指感染超過 1 年之無症狀期，傳染力較弱。

預防方法：

1. 避免多重性伴侶。
2. 性行為過程中，全程且正確使用保險套，若需要使用潤滑液，應選用水性潤滑液，不可使用油性潤滑物質（如嬰兒油、凡士林），以避免保險套破損。
3. 如有懷疑自己感染梅毒，勿自行至藥局買藥或誤信偏方，請儘速就醫，早期診斷、早期接受治療。
4. 懷孕婦女應於懷孕 12 週及 32 週產檢時接受梅毒篩檢。

治療方法與就醫資訊：

目前已有抗生素可以有效治療

如果出現梅毒臨床症狀或懷疑自己感染梅毒，請立即就醫治療，可至醫療院所泌尿科、皮膚科、婦產科等科別看診，亦可參考本局之友善性病門診推薦醫師名單，並同時接受愛滋病毒篩檢。

資料來源取自 衛生福利部疾病管制署