

流行性腦脊髓膜炎防疫

一、依衛生福利部疾病管制署(以下簡稱疾管署)新聞稿指出，軍營有發生流行性腦脊髓膜炎群聚感染。流行性腦脊髓膜炎為猝發性急性傳染病，可透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者噴嚏及咳嗽產生之飛沫而感染，潛伏期 2 到 10 天。症狀包含發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹及精神學症狀（如精神錯亂）等。家庭親密接觸者、人口密集機構或曾至高風險地區旅遊等為感染之高危險族群。

二、應保持個人良好衛生習慣如勤洗手及注意咳嗽禮節，妥善處理口鼻分泌物，並於處理後立即洗手；維持室內空氣流通，避免到過度擁擠、通風不良的場所。如計劃至流行性腦脊髓膜炎流行地區，請先至國內旅遊醫學門診諮詢評估接種疫苗，旅遊時保持良好個人衛生習慣，以降低感染機率，返國後如出現疑似症狀應立即就醫，並主動告知近期旅遊史。相關資訊可至疾管署全球資訊網 (<http://www.cdc.gov.tw>) 查詢或撥打國內免付費防疫專線 1922 (0800-001922) 洽詢。